EVENTO REALIZZATO GRAZIE AL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI


sponsor evento


iscriviti: sicobperugia.cloud

FACOLTA' DI AGRARIA PERUGIA

EVENTO ACCREDITATO SICOB ID Evento 436660 - Crediti ECM 6

SEGRETERIA ORG. SICOB EXE Referente Eliana Rispoli





SICOBEVENTI R. Bellini - A. Contine - I. Grandone

PERUGIA, 9 GIUGNO 2025


ADVANCED BARIATRIC SURGERY CHIRURGIA BARIATRICA ASSOCIATA AD ALTRI INTERVENTI E CHIRURGIA REVISIONALE

CHIRURGIA PLASTICA° POST-BARIATRICA

Dott.ssa Alessandra Barile

UOC Chirurgia Plastica e Ricostruttiva Usl Umbria1 Responsabile Dott. M. Cordellini









Risultati morfofunzionali ed estetici ottenuti

interventi di body contouring

Centri di Chirurgia
Bariatrica sempre più
numerosi

° Criteri di inclusione per accedere al percorso ricostruttivo in convenzione SSN

• Tutti i pazienti post-bariatrici

• I pazienti con calo ponderale di oltre 30 kg dopo percorso nutrizionale certificato

Condizione Clinica	Criteri d'inclusione	Tipo di Intervento Regime appropriato di erogazione
Ipertrofia Mammaria (non in corso di simmetrizzazione a seguito intervento oncologico) Trattamento da effettuarsi se sono presenti almeno 4 criteri d'inclusione, con il criterio 6 BMI vincolante.	 Ricorrenza di dermatiti locali (+ di 2 episodi documentabili all'anno) Massa da asportare bilateralmente superiore al 2% (+/- 0,5) della massa corporea Distanza giugulo-capezzolo superiore al 18% (+/-2) dell'altezza Anamnesi di "Grande Obesità" Alterazioni documentate della statica vertebrale BMI: Indice di Massa Corporea (peso/altezza2) inferiore a 30 Evidenza Strumentale di Fibroadenomi multipli (ecografia) 	Mastoplastica Riduttiva Mastopessi Regime assistenziale: D.S. R.O.
Addome Pendulo Trattamento da effettuarsi se sono presenti almeno 4 criteri d'inclusione con il criterio 5, BMI vincolante	 Presenza di laparocele, ernie o diastasi muscoli retti di grado elevato Ricorrenza di dermatiti locali (+ di 2 episodi documentabili all'anno) Resezione prevista superiore al 3 (+/- 0,5) % massa corporea Anamnesi di "Grande Obesità" BMI: Indice di Massa Corporea (peso/altezza²) inferiore a 30 	Addominoplastica con o senza plastica muscolare Regime assistenziale Ricovero Ordinario
Lipodistrofia cosce Trattamento da effettuarsi se sono presenti almeno 3 criteri d'inclusione, con criterio 4 BMI vincolante	 Ricorrenza di dermatiti locali (+ di 2 episodi documentabili all'anno) Lipodistrofia pseudocapsulata (Ecografia) Anamnesi di "Grande Obesità" BMI: Indice di Massa Corporea (peso/altezza²) inferiore a 30 	Liposuzione Lifting Cosce Regime assistenziale Ricovero Ordinario
Dismorfismo Brachiale Lipodistrofia Dermatocalasia braccia Trattamento da effettuarsi se sono presenti almeno 2 criteri d'inclusione, con criterio 4 BMI vincolante	 Ricorrenza di dermatiti locali (+ di 2 episodi documentabili all'anno) Limitazione funzionale con rapporto 1,8 (+/- 0,1) tra circonferenza max. braccio ed avambraccio BMI: Indice di Massa Corporea (peso/altezza²) inferiore a 30 	Liposuzione Brachioplastica Regime assistenziale: R.O. D.S.

O

Ò

TRATTAMENTO OBESITÀ PATOLOGICA

Approccio multidisciplinare

BODY CONTOURING POST OBESITÀ PATOLOGICA

PERCORSO MULTIDISCIPLINARE PER IL RIMODELLAMENTO CORPOREO DEL

PAZIENTE EX-OBESO

Ospedale Media Valle Del Tevere (Settembre 2016)

- Chirurgo plastico
- Nutrizionista
- Psicologo/Psichiatra
- Anestesista
- Chirurgo generale
- Medico internista
- Fisioterapista



VISITA CHIRURGIA PLASTICA

1. Requisiti di idoneità o corrette indicazioni al percorso ricostruttivo

2. Attento ascolto delle aspettative del paziente

3. Percorso informativo preoperatorio

4. Acquisizione del consenso informato

1. Requisiti di idoneità o corrette indicazioni al percorso ricostruttivo

- importanti dimagrimenti con alterazioni della morfologia corporea
- BMI ottimale in relazione all'età, comunque non superiore a 30kg/m2
- stabilità del peso e del BMI raggiunto da almeno 6 mesi
- assenza di patologie concomitanti o di gravi fattori di rischio
- valori di Hb uguali o superiori ad 11 g/dl




GRAVI FRUSTRAZIONI E INSODDISFAZIONI IN PZ <u>NON PREPARATI</u>, <u>SCARSAMENTE MOTIVATI</u>, <u>NON COLLABORANTI</u> O <u>ANIMATI DA</u> <u>ASPETTATIVE NON REALISTICHE</u>

3. Percorso informativo preoperatorio


- Illustrare il percorso ricostruttivo
- Focalizzare l'attenzione sull'intervento proposto (no più di un intervento nella stessa seduta operatoria)
- Esporre meticolosamente le eventuali complicanze maggiori e minori
- Spiegare l'importanza del comportamento del pz nel post-operatorio ed i tempi di convalescenza e recupero

AMBULATORIO MULTIDISCIPLINARE PER IL RIMODELLAMENTO CORPOREO DEL PAZIENTE EX-OBESO


Odal settembre 2016 ad oggi sono stati presi in carico dal nostro servizio oltre 1300 pazienti




AMBULATORIO MULTIDISCIPLINARE PER IL RIMODELLAMENTO CORPOREO DEL PAZIENTE EX-OBESO





CASISTICA PER TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI



ADDOMNOPLASTICA





















































PUBOPLASTICA







TORSOPLASTICA &



BRACHIOPLASTICA

il calo ponderale a seguito di un intervento di chirurgia bariatrica o di un percorso nutrizionale porta, con la perdita di elasticità cutanea a livello delle braccia, alla formazione di una plica cutanea, composta da pelle e tessuto adiposo in eccesso che gli anglosassoni chiamano "batwing", braccia ad ali di pipistrello






The Pittsburgh Rating Scale (Scala di Pittsburgh)

Area	Punteggio	Scala	Procedura preferita
Arms Braccia	0	Normale	Nessuna
	1	Adiposità con buon tono cutaneo	Liposuzione con o senza ultrasuoni
	2	Pelle lassa e pendula senza grave adiposità	Brachioplastica
	3	Pelle lassa e pendula con grave adiposità	Brachioplastica ± Liposuzione con o senza ultrasuoni



































LIPOASPIRAZIONE
















LIPOASPIRAZIONE E LIFTING COSCE




















6 MASTOPESSI E MAMMOPLASTICA RIDUTTIVA

Le pazienti che hanno avuto un dimagrimento importante a seguito di una dieta drastica o, nei casi di obesità, di un percorso di chirurgia bariatrica, presentano frequentemente uno scivolamento verso il basso del parenchima mammario, condizione definita ptosi mammaria.



PTOSI MAMMARIE

Ipotrofia mammaria


Ipertrofia mammaria o gigantomastia

Mastopessi

Mastoplastica riduttiva


N BASE AL RIPOSIZIONAMENTO DEL CAC E DELLE CICATRICI RESIDUE

Mastopessi con cicatrice PERIAREOLARE ROUND-BLOCK





Mastopessi con cicatrice VERTICALE o a "T ROVESCIATA"
















เมวเามตวงสรอ เวเมนวร
























grazie